

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 28-7-70 071578

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE RENNES (Tél. 36-01-74)

(~~CALVADOS~~, COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, ~~MANCHE~~, MORBIHAN, ~~ORNE~~)

Sous-Régisseur de Recettes de la D.D.A. — Protection des Végétaux. Route de Fougères, RENNES

C. C. P. RENNES 9404-94

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

SUPPLEMENT N° 1 AU BULLETIN N° 118

22 JUILLET 1970

AVERTISSEMENTS

POIREAU

TEIGNE : Quelques galeries creusées dans les feuilles par ce parasite ont été observées au cours de ces derniers jours, notamment dans la région de ST-MALO. Les dégâts risquant de s'accroître rapidement il est conseillé de bien surveiller les cultures et, si la présence de la teigne est constatée, d'effectuer un traitement avec du parathion auquel on adjoindra un mouillant.

TOMATE

MILDIOU : Les conditions climatiques de la région n'ont pas permis au mildiou de se développer sur cette culture. Toutefois, dans les zones où cette maladie sévit sur les pommes de terre, il est prudent d'assurer une couverture fongicide afin d'éviter l'installation de foyers.

INFORMATIONS

CHOU

PUCERONS ET CHENILLES DIVERSES : Les conditions climatiques étant favorables à la multiplication de ces ennemis animaux il est prudent d'observer les cultures de façon à réaliser éventuellement un traitement insecticide avant que les dégâts ne soient commis.

CHRYSANTHEME

SEPTORIOSE, ROUILLE : La période actuelle est habituellement propice au développement de ces deux maladies. Il est donc nécessaire d'assurer une protection régulière avec l'un des produits suivants : Mancozèbe, Manèbe, Zinèbe ou Zirame.

VERTICILLIOSE : Cette affection se caractérise par un flétrissement brusque de certaines tiges, suivi d'un dépérissement général de la plante. En cas d'attaque effectuer 3 pulvérisations à 8 jours d'intervalle avec du Benomyl à raison de 30 g. de m.a. par hectolitre d'eau.

ANGUILLULE DU FEUILLAGE : Au cours des traitements contre la septoriose ou la rouille on ajoutera à la bouillie 50 g. de parathion par hectolitre, sous forme de poudre mouillable.

L'Ingénieur d'Agronomie,

A. CRESPIY.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux,

J. DELOUSTAL.